

CALENDÁRIO VACINAL

RECOMENDAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES (SBIm)

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																			ADOLESCENTE	ADULTO	IDOSO					
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos	20 a 59 anos	A partir de 60 anos					
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase											
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento						Vacinar os não vacinados anteriormente																				
Rotavírus		Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VRI ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida						CONTRAINDICADA																			
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTPa)		Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa	Vacinar os não vacinados anteriormente	Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)											
Haemophilus influenzae b		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente				Vacinar pessoas em situações especiais de risco										
Poliomielite (vírus inativados)		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente	REFORÇO				Vacinar pessoas em situações especiais de risco									
Pneumocócicas conjugadas		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente				VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco				VPC13: uma dose						
Meningocócicas conjugadas		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	REFORÇO				REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos	Vacinar pessoas em situações especiais em risco									
Meningocócica B		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente: De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses. De 24 meses a 19 anos: duas doses				Vacinar pessoas em situações especiais em risco										
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)		CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																									
Influenza (gripe)		VACINAÇÃO ANUAL																									
Febre amarela		Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias, dose única. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.																									
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)												Duas doses a partir dos 12 meses				Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco						
Varicela (catapora)												Duas doses a partir dos 12 meses				Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente											
Hepatite A												Duas doses a partir dos 12 meses				Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco						
HPV																Duas doses para meninas e meninos				Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses	Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)						
Pneumocócica 23 valente																						Vacinar pessoas em situações especiais de risco				Duas doses com intervalo de cinco anos	
Herpes zóster																										De 50 a 59 anos: a critério médico	Uma dose
Dengue	CONTRAINDICADA															Recomendado para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 - 6 - 12 meses				CONTRAINDICADA							